

BOTÁNICA.—Descripción de algunas plantas nuevas de la flora
chilena por don Carlos Renjifo i don R. A. Philippi.

MUTISIA SPLENDENS Renjifo.

M. caule glabro, ramoso, flexuoso, striato, scandente, tereti, haud alato; foliis, quae sub capitulo in bracteas subulatas, breves, integras, mucronatasque mutantur, oblongo-lanceolatis coriaccis, rigidis, viridibus, basi subcordatis vel subhastatis, utrinque glaberrimis, ad axillas gossypinis, supra tenuiter et parum perspicue reticulatis, horizontalibus vel saepe retroflexis, nervo medio prae-cipue subtus valde incrassato, in cirrum simplicem rigidum revolutum, folio breviorem apice producto, marginibus basi dentibus 4–10, inaequalibus, spinosis armatis, apice dentibus 2–4 spinosis onusto aut rarius integro, plus minusve obtuso, majoribus 2–2½ poll. longis, 7 lin. parte latiore latis, sessilibus, haud decurrentibus, semper internodiis longioribus; floribus magnis, 3–3½ poll. longis, ligularum tubo inclusi, ejusdem diametri; involucro cylindrico, lato, disco floribus disci breviore, squamis glabris formato, extimus late triangularibus, apendicibus lanceolatis seu subulatis, mucronatis, horizontalibus vel reflexis apice terminatis; squamis interioribus longioribus, oblongis, apice retusis, barbatis breviterque mucronatis, omnibus margine membranaceo, rubescente ornatis; calathi ligulis 12–13, 1½ poll. longis dempto tubo, 3 lin. latis, splendide coccineis, velutinis.

Inveni in montibus praedii «Vichiculen» dicti, in departamento Quillota, decembri 1881. Carlos Renjifo.

HABRANTHUS SPLENDENS Renjifo.

H. bulbo ovato, supra in collum plus minusve longum desinente, membranis fuscis operto; foliis binis ad quaternis, linearibus, infra praesertim attenuatis, viridibus aut viridi-glaucoscentibus, planis aut vix canaliculatis, striatis intus in tubos vacuos septis membranaceis separatos divisis, 3-6 lin latis, $\frac{1}{2}$ -3 pedes et ultra longis, suberectis vel reclinati, scapo aequilongis aut longioribus; scapo fistuloso tereti, eretto, viridi vel viridi-glaucoscente, basi purpurascente, apice graciliore, erasitie variabili, interdum diametro basis 6 lin., 1-2 pedes et ultra longo, 1-3 flores pedunculatos apice gerente; foliolis spathae diphyllae ovato-lanceolatis, membranaceis, rubrescentibus, obtusis, marcescentibus, saepe pedunculis longioribus; pedunculis inaequalibus erectis, $\frac{1}{2}$ -2 poll. longis, post anthesin ut videtur magis elongatis, basi bracteis membranaceis marcescentibus, linearibus, saepe eis longioribus suffultis; perigonio eretto aut parce declinato, infundibuliformi, breviter tubuloso, sexpartito, sectionibus ejus subaequalibus, lanceolatis, supra reflexo-patentibus, 36 lin. et ultra longis, 7-12 lin. latis, tribus sepalinis apice acutiusculis, barbatis, tribus petalinis obtusis, omnibus fere a medio usque ad apicem splendide cinnabarinio-aurantiacis, exinde usque ad basin luteo-viridibus, lineis rubris, quae basin non attingunt notatis; tubo $1\frac{1}{2}$ -2 lin. longo; fancis appendicibus oblongis, luteolis, apice inaequaliter laciniatis, $2\frac{1}{2}$ -3 lin. longis, staminibus inaequalibus declinatis, apice reflexo-erectis rubrisque, basi albidis, tribus longioribus stylo brevioribus; stylo declinato, deinde reflexo-erecto, superne rubro, inferne albidio, perigonium vix aequante; stigmate obtuse trilobo, villosi; ovario turbinato-triquetro; capsula.....

An plauta noster eadem est atque *Habranthus pratensis* (Herb)? sed ex brevi descriptione hujus speciei in opere Gayi vol. VI pág. 70 et 71 data haud facile est negotium patefacere.

Credit ad pratula uda in silva «de Chimbarongo» dicta in prov. Calchaguet octobri 1883 florebat. Carlos Renjifo.

Ab *H. splendente* Hook, primo adspectu stamiuibus stylo quo rubris non luteis distinguitur. Philippi.

MIMULUS AURANTIACUS Renjifo

M. herbaceus, glaber; caulis simplicibus vel inferne ramosis, basi saepe decumbentibus et radicantibus, deinde erectis nunc 1 $\frac{1}{2}$ poll., nunc usque ad 7 poll. et ultra longis. Folia opposita, inferiora plus minusve longe petiolata, sessilia, forma dimensionibus que valde variabilia, lanceolata, ovata et interdum late ovata, caulina inferiora et media majora, aliquando usque 1 $\frac{1}{2}$ poll. longa, petiolo inclusa, et 8 lin. lata, saepe internodiis breviora et remota, sed nonnunquam eis longiora et approximata, omnia utrinque glaberrima, obtusiuscula, 3–5 nervia, tenuiter inaequaliterque dentata, interdum subintegra. Flores ad axillam foliorum superiorum oppositi, pedunculati, pedunculo erecto, saepe folio suo longiore, sed interdum eo breviora; calyce tubuloso-campanulato, glabro aut sublente obscure glanduloso, saepe purpureo-punctato, 4–5 lin. longo, post anthesin accrescente, quinquedentato, dentibus obtusiusculis, inaequalibus, superiore reliquis majore, ad angulos basi pilosis; corolla infundibuliformi, tubo inferne cylindrico, angustato, deinde usque ad limbum sensim dilatato, pulchre aurantiaca, limbo patente, saepe obscurius maculata, tubo intus pilis squamosis aurantiacis onusto et frequenter obscurius maculata; limbi lobulis subrotundis, apice vix retusis, 8–12 lin. longa, 7–12 lin. in limbo lata.—Variat corolla aurea, concolore. Habitat ad riovulos in Andibus provinciae Santiago, in praedio «los Perales» dicto, circa 3000 metros supra mare; februario 1882 florebat. Carlos Renjifo.

GEANTHUS Philippi

Novum genus Liliacearum.

Perigenium hypogynum, hexaphyllum; foliola biseriata, aequallia, basi ovata, abrupte in caudam longam setaceam producta, viridia, basi et in cauda violaceous; margo baseos fere hyalinus.—Stamina hypogyna, inclusa, monadelpha; filamenta usque ad medium concreta, pallide viridia, demum libera, cylindrica, violacea. Antherae basi affixa, lineares, pallide violaceae, exakte lateraliter dehiscentes, tempore floredi horizontaliter patentes, deinde collapsae pendulae; pollen flavum. Ovarium ovatum, triloculare, polyspermum; ovula in quovis loculo biseriata. Stylus crassus,

rectus, stamina superans, obscure violaceus; stigma crassum, peltatum, obscure trilobum, pallide violaceum. Fructus.....

Bulbus cinereus, magnitudine nucis juglandis. Folia fere plana vel perparum canaliculata, numero quatuor, laete viridia, linearia, cirea 75 millim. longa, 4 mm. lata. Pedunculi plures, radicales, uniflari, bractea hyalina, flore breviore fulti, ante et simul cum foliis erumpentes. Septembre anni 1884 florere incipit in horto.

Bulbus ex Andibus prov. Santiago allatus fuit.

Speciei nomen *Geanthus humilis* imposui. Dr. R. A. Philippi.